ORDONNANCE DE PRODUITS SANGUINS LABILES

N° d'ordonnance

Joindre les documents de groupage sanguin et pour les CGR, le résultat de la RAI valide (ou les prélèvements pour leur réalisation)

MEDECIN - PRESCRIPTEUR

Nom (lisible et en majuscule):

Téléphone du prescripteur:

Signature (obligatoire)

Date de la prescription: | | | | |

ETABLISSEMENT DE SANTE:

Service (UF):

Tél. direct:

PATIENT (coller l'étiquette du patient)

Nom de famille (ou de naissance):

Nom d'usage (marital ou autre):

Prénom:

Né(e) le : Sexe : F MPour nouveau-né: préciser le terme (SA): Poids: g

Et l'identité complète de la mère:

Pour une transfusion non urgente ou programmée:

Date et heure souhaitées de la délivrance: le / /

à H.....

Si transfusion urgente cocher la mention adéquate

 Urgence Vitale Immédiate (délivrance sans délai) et ☎ à l'EFS Urgence Vitale (délai obtention < 30 minutes) et ☎ à l'EFS Urgence relative (délai obtention 2 à 3 heures)

Une ordonnance par type de PSL hors UV et UVI

Renseignements cliniques et biologiques :

 Greffe organe Greffe CSH Aplasie médullaire Myélodysplasie Drépanocytose Autre:

CONCENTRE de GLOBULES ROUGES (CGR)

Quantité Ferme :

Quantité Réserve :

ou Volume : mL

Hb : g/dL

Qualification/transformation (voir verso)

- Phénotypé RH KEL
- Irradié (préciser indication):
- Compatibilisé (joindre un tube EDTA)
- Autres (préciser):

 Traceur température

(entreposage/relais)

Indication:

 Délivrance souhaitée des PSL en réserve

..... / /

 Je prescris la prolongation de la validité de la RAI négative à 21 jours en absence de transfusion, grossesse ou greffe depuis 6 mois Nom et Signature (obligatoire) :

CONCENTRE de PLAQUETTES (CP) Quantité Ferme : Quantité Réserve :

Plaquettes: G/L. Date de la numération: / / Poids

 Irradié (préciser indication): Autre (préciser):Posologie souhaitée : en 10¹¹ plaquettes (posologie au verso).

Le choix du produit posologie et nature (MCP ou CPA) sera sélectionné en fonction des produits disponibles par le site de délivrance

Le taux de plaquettes, et le poids du patient sont à renseigner obligatoirement

PSL:

Nb:

(si différent)

Service:

Prescripteur:

.....

PLASMA FRAIS CONGELE (PFC)

Quantité Ferme : Quantité Réserve :

Nombre : PFC ou Volume : mL

 VHE négatif (indications au verso)

(1 PFC = 200 mL minimum)

Indication à cocher :

- Hémorragies aiguës avec déficit global des facteurs de coagulation
- Echange plasmatique (préciser la pathologie):
- Déficits complexes rares en facteurs de coagulation
- CIVD
- Autres (préciser):

PRODUITS SANGUINS LABILES AUTOLOGUES

Quantité CGR :

Quantité PFC :

Sites	Tel et Fax	Sites	Tel et Fax	Sites	Tel et Fax
Aix Pce	04.42.33.97.72 / 04.42.33.99.08	Ajaccio	04.95.29.90.59 / 04.95.29.94.28	Arles	04.90.49.29.50 / 04.90.49.28.83
Avignon	04.90.81.14.01 / 04.90.87.53.20	Bastia	04.95.59.18.76 / 04.95.59.12.83	Cannes	04.93.94.82.35 / 04.93.94.82.34
Gap	04.92.40.67.24 / 04.92.40.67.21	Toulon	04.98.08.08.70 / 04.94.36.23.46	St Laurent	04.92.27.52.47 / 04.92.27.52.49
MRS Baille	04.91.18.95.01 / 04.91.18.95.10	MRS Nord	04.91.96.88.57 / 04.91.96.85.22	MRS IPC	04.91.17.84.70 / 04.91.17.84.71
MRS Timone	04.91.38.75.43 / 04.91.38.80.21				

EFS Provence Alpes Côte d'Azur et Corse – 149 Boulevard Baille, 13005 Marseille

Choix PSL	Indications
CGR de moins de 5 jours	<ul style="list-style-type: none"> Transfusion in utero Transfusion massive en période néonatale Exsanguinotransfusion du nouveau-né
CPA	<ul style="list-style-type: none"> Respect du phénotype dans les systèmes HLA ou HPA Adaptation de la dose à transfuser en particulier en pédiatrie et néonatalogie (Division de plaquettes)
Qualification	Indications
CGR Phénotypé RH KEL	<ul style="list-style-type: none"> Patient immunisé contre un antigène du système Rhésus Kell (RH-KEL1) Femme de la naissance à fin période procréatrice (moins de 50 ans) Hémoglobinopathies Affections chroniques nécessitant transfusions répétées (ex myélodysplasies) Groupe sanguin rare
CPA phénotypé	<ul style="list-style-type: none"> Etat réfractaire lié à la présence d'anticorps anti-HLA ou d'anticorps anti-HPA chez le receveur
CGR Phénotype étendu	<ul style="list-style-type: none"> Patient immunisé contre au moins un antigène dans un système autre que RH-KEL1
CGR Compatibilisé (joindre un tube EDTA et la demande d'analyse)	<ul style="list-style-type: none"> Patients présentant ou ayant présenté ou suspecté de présenter un ou plusieurs allo-anticorps érythrocytaires Nouveau né ayant un test direct à l'antiglobuline positif ou né de mère allo-immunisée Patient drépanocytaire
Transformation	Indications
PSL Irradié	<ul style="list-style-type: none"> Déficit immunitaire congénital cellulaire 7 jours avant et pendant un prélèvement de Cellules Souches Hématopoïétiques (auto ou allo) Autogreffe : début du conditionnement et jusqu'à 3 mois après autogreffe (1an si irradiation corporelle totale) Allogreffe : début du conditionnement et jusqu'à 1 an après allogreffe (définitif si réaction du greffon contre l'hôte ou traitement immunosuppresseur) Traitement par analogues des purines et pyrimidiques (fludarabine, pentostatine, cladribine, clofarabine, etc) : jusqu'à 1 an après fin du traitement Traitement par SAL ou anti-CD52 ou anticorps monoclonaux anti-lymphocytes T Immunosuppression T profonde hors VIH Transfusion foetale et jusqu'aux 6 mois corrigés Exsanguino-transfusion et transfusion massive du nouveau-né (vol>20ml/kg ou >80ml/kg/24h ou débit >5ml/kg/h) Dons dirigés intra-familiaux Transfusion de CPA HLA compatible si donneur HLA identique ou approchant
PSL Déplasmatisé	<ul style="list-style-type: none"> Déficit en IgA senque avec anticorps anti-IgA Antécédents de réactions transfusionnelles anaphylactiques majeures mettant en jeu le pronostic vital Antécédents d'effets indésirables receveurs allergiques de grade de sévérité inférieur, si obstacle à la transfusion
CGR réduit de volume	<ul style="list-style-type: none"> Transfusion in utero
PSL cryoconservé	<ul style="list-style-type: none"> Phénotype rare ou exceptionnel Mélange complexe d'allo-anticorps

L'EFS recommande l'utilisation de plasmas frais congelé VHE négatif dans les situations suivantes

VHE négatif	<ul style="list-style-type: none"> Transplantations organes Grefe allogénique de cellules souches hématopoïétiques Autres déficits immunitaires sévères Hépatite chronique active, fibrose ou cirrhose hépatique
-------------	--

Rappel de la posologie des CP et PFC selon les recommandations de l'HAS

CP : Adulte 0,5 à 0,7.10¹¹/10 kg; Enfant : 0,7.10¹¹/10 kg; Nouveau-né : 0,1 à 0,2 10¹¹/kg
 PFC : en cas d'hémorragie environ 15 mL /kg

Synthèse sur l'acte transfusionnel :

Contrôle ultime pre-transfusionnel réalisé en présence du patient	Surveillance de l'acte transfusionnel	Conduite à tenir si incident au cours de la transfusion
<ol style="list-style-type: none"> Contrôle ultime de concordance des documents <ul style="list-style-type: none"> Vérification de l'identité du receveur. Concordance de l'identité du receveur avec celle mentionnée sur les documents : <ul style="list-style-type: none"> Prescription de PSL, Fiche de Délivrance (FD), Document IH, Concordance du groupe sanguin entre PSL et dossier IH. Concordance des données d'identification du PSL portées sur l'étiquette et sur la FD. Contrôle ultime de compatibilité lors de la transfusion de CGR (homologue ou autologue) à l'aide d'une carte de contrôle. 	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier la date de péremption du PSL et le délai des 6 heures à compter de la réception des produits Mesure de la tension artérielle, de la température, de la fréquence cardiaque et si possible de la saturation <u>avant transfusion</u>. Surveillance attentive et continue au moins dans les quinze premières minutes puis régulière. Description précise de tout événement ou effet indésirable (procédures). Réalisation et transcription sur le document approprié de la traçabilité (fiche de délivrance). 	<ol style="list-style-type: none"> Arrêter la transfusion. Conserver la voie d'abord. Appeler le médecin en charge du patient. Vérifier la tension artérielle, la température, la fréquence cardiaque et si possible la saturation. Débrancher le PSL et faire un nœud à sa tubulure. Prévenir l'EFS (téléphone + fax) Informers le service « hémovigilance » de l'ES dans les 8 heures. Selon l'orientation diagnostique, faire les prélèvements complémentaires nécessaires tels que définis dans les procédures de l'ES

Pour toute interrogation merci de vous adresser à la personne en charge du conseil transfusionnel de votre ETS référent